Exercice 1

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \frac{\sqrt{\ln^2 x - \ln x} - x}{x}$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1) a) Déterminer D_f le domaine de définition de f et calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Etudier les branches infinies de (C_f) .

2) Etudier la dérivabilité de f à droite en $x_0 = e$ et à gauche en $x_0 = 1$.

3) a) Montrer que f est dérivable sur $D_f - \{1; e\}$ et $(\forall x \in D_f - \{1; e\})$;

$$f'(x) = \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{2x^2 \sqrt{\ln^2 x - \ln x}}$$

b) Etudier les variations de f ; puis dresser son tableau de variation.

c) Construire (C_f) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

4) Montrer que f réalise une bijection de $]0; 1]$ vers un intervalle J à déterminer.

5) Montrer que f^{-1} (fonctions réciproques de f) est dérivable en $\sqrt{2}$; puis calculer $(f^{-1})'(\sqrt{2})$.

6) Construire $(C_{f^{-1}})$ la courbe de f^{-1} ; dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Exercice 2

I - Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $g(x) = \ln(x^2) + \frac{1}{x} + 1$

1) Etudier les variations de g ; puis dresser dan tableau de variations

2) Déterminer le signe de $g(x)$ dans $\mathbb{R}^*$.

II - On considère la fonction f définie par : $f(x) = x \ln(\sqrt{x} - 1)^2$.

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1) a) Déterminer D_f le domaine de définition de f .

b) Calculer les limites de f aux bornes de D_f .

2) Etudier la dérivabilité de f à droite en $x_0 = 0$

3) a) Montrer que f est dérivable sur D_f et que : $(\forall x \in D_f); f'(x) = g(\sqrt{x} - 1)$.

b) Dresser le tableau de variation de f .

4) Montrer que (C_f) admet un point d'inflexion d'abscisse strictement supérieur à 1.

5) a) Etudier les branches infinies de (C_f)

b) Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à (C_f) au pont d'abscisse $x_0 = 4$

6) Construire (C_f) et (T) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Exercice 3

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x + \ln x$

1) Montrer que f réalise une bijection de $]0; +\infty[$ vers un intervalle J à déterminer.

2) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) (\exists ! x_n \in \mathbb{R}_+^*) ; f(x_n) = n$

3) a) Calculer x_1

b) Etudier la monotonie de la suite (x_n) .

c) Dédire que (x_n) est divergente.

4) Etudier le signe de $f(n) - n$; puis déduire que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; x_n \leq n$.

5) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; n - \ln(n) \leq x_n$

6) a) Montrer que x_n peut s'écrire sous la forme : $x_n = n(1 + a_n)$

b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$

c) Dédire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + \ln(n) - n) = 0$

Exercice 4

I) On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = x^2 - 1 - x \ln x & ; \text{ si } x > 0 \\ f(0) = -1 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^+$.

2) a) Etudier la dérivabilité de f à droite en 0 ; puis donner une interprétation géométrique au résultat.

b) Dresser le tableau de variation de f^{-1}

3) Etudier la branche infinie de (C_f) au voisinage de $+\infty$.

4) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}^+$ vers un intervalle I à déterminer

b) Dresser le tableau de variation de f^{-1} la fonction réciproque de f .

5) Soit $k \in \mathbb{N}$.

a) Montrer que l'équation $f(x) = k$ admet une solution unique x_k dans $\mathbb{R}^+$.

b) Déterminer x_0 et vérifier que : $\frac{2}{3} < x_1 < 2$.

c) Donner l'expression de x_k en fonction de f^{-1} ; puis montrer que la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante; puis déterminer $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k$

6) Construire (C_f) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

II- On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2}{x} + \ln x$;

et la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} u_0 = \frac{3}{2} \\ u_{n+1} = g(u_n) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

1) Dresser le tableau de variations de g .

2) Montrer que : $g\left(\left[\frac{3}{2}; 2\right]\right) \subset \left[\frac{3}{2}; 2\right]$. (on prend $g\left(\frac{3}{2}\right) \approx 1,73$; $g(2) \approx 1,69$)

3) a) Dresser le tableau de variation de g' .

b) Dédire que : $\left(\forall x \in \left[\frac{3}{2}; 2\right]\right); |g'(x)| \leq \frac{2}{9}$

4) a) Montrer que : $(\forall x \in]0; +\infty[); g(x) = x \Leftrightarrow f(x) = 1$

b) Dédire que x_1 est l'unique solution de $g(x) = x$.

5) a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}); |u_n - x_1| \leq \left(\frac{2}{9}\right)^n$.

6) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et calculer sa limite.

WWW.GUESSMATHS.CO