Exercice 1

Soit A l'ensemble des matrices s'écrivant $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ avec a et b des entiers relatifs.

- 1) Démontrer que A est un anneau pour les lois d'addition et de produits de matrices.
- 2) Déterminer les éléments inversibles de A .

Corrigé

1) Il suffit de démontrer que A est un sous-anneau de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \times)$. Pour cela, on remarque que :

• $A \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $I_2 \in A$ (choisir $a=1$ et $b=0$) ;

• Si $M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ et $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & a' \end{pmatrix}$ sont dans A , alors $M - M' = \begin{pmatrix} a - a' & b - b' \\ 0 & a - a' \end{pmatrix}$ et

$M \times M' = \begin{pmatrix} aa' & ab' + ba' \\ 0 & aa' \end{pmatrix}$ sont dans A .

• De plus $\times$ est associative car elle l'est dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

• $\times$ est distributive par rapport à l'addition car elle l'est dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Donc $(A; +; \times)$ est un sous-anneau de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \times)$; par suite $(A; +; \times)$ est un anneau.

2) Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ inversible dans A . Alors il existe $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & a' \end{pmatrix}$ dans A tel que

$$M \times M' = I_2.$$

On obtient $\begin{pmatrix} aa' & ab' + ba' \\ 0 & aa' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$

Donc $\begin{cases} aa' = 1 \\ ab' + ba' = 0 \end{cases}$ et comme a et a' sont dans $\mathbb{Z}$, on doit avoir $a = \pm 1$, et $a' = 1$.

Réciproquement, soit $M \in A$ qui s'écrit $M = \begin{pmatrix} \pm 1 & b \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$ avec $a = \pm 1$. Posons

$M' = \begin{pmatrix} \pm 1 & -b \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$. Alors $M \times M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$. Ainsi, M est inversible. On a donc démontré que les éléments inversibles de A sont ceux pour lesquels $a = 1$ ou $a = -1$.

Exercice 5

Soit D l'ensemble des nombres décimaux, $D = \left\{ \frac{n}{10^k}; n \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N} \right\}$.

Démontrer que $(D; +; \times)$ est un anneau.

Quels sont ses éléments inversibles?

Corrigé

On va prouver que $(D; +; \times)$ est un sous-anneau de $(\mathbb{Q}; +; \times)$. On remarque d'abord que $D \subset \mathbb{Q}$, puis que $1 \in D$.

De plus, soient $x = \frac{n}{10^k}$ et $y = \frac{m}{10^{k'}}$ deux éléments de D . Alors

$x - y = \frac{n}{10^k} - \frac{m}{10^{k'}} = \frac{n10^{k'} - m10^k}{10^{k+k'}}$ et $x \times y = \frac{n}{10^k} \times \frac{m}{10^{k'}} = \frac{n \times m}{10^{k+k'}}$ sont clairement des éléments de D , et $(D; +; \times)$ est bien un sous-anneau de $(\mathbb{Q}; +; \times)$.

Déterminons ensuite les inversibles de $(D; +; \times)$.

Soit $x = \frac{n}{10^k}$ inversible, d'inverse $y = \frac{m}{10^{k'}}$.

Alors $x \times y = 1 \Leftrightarrow \frac{n \times m}{10^{k+k'}} = 1$

$$\Leftrightarrow n \times m = 10^{k+k'}$$

.On en déduit que les seuls diviseurs premiers de n sont 2 et 5, autrement dit que n s'écrit $n = \pm 2^p \times 5^q$ pour $((p; q) \in \mathbb{N}^2)$.

Réciproquement, soit $x = \pm \frac{2^p \times 5^q}{10^k}$ et montrons que x est inversible dans D .

Posons $y = \pm \frac{10^k}{2^p \times 5^q}$. Il suffit de vérifier que y est élément de D .

On peut aussi écrire $y = \pm \frac{10^k}{2^p \times 5^q}$

$$= \pm \frac{10^k \times 2^q \times 5^p}{2^{p+q} \times 5^{q+p}}$$

$$= \pm \frac{2^{q+k} \times 5^{p+k}}{10^{p+q}}$$

Et on vérifie facilement que $x \times y = 1$

Ainsi, les inversibles de $(D; +; \times)$ sont les éléments $x = \pm \frac{2^p \times 5^q}{10^k}$, avec $((p; q; k) \in \mathbb{N}^3)$.

Exercice 6

On considère $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} / (a; b) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1) Montrer que $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]; +; \times)$ est un anneau.

2) On note $N(a + b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2$.

Montrer que, pour tous x, y de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, on a $N(xy) = N(x)N(y)$.

En déduire que les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ sont ceux s'écrivant $a + b\sqrt{2}$ avec $a^2 - 2b^2 = \pm 1$.

Corrigé

1) Il suffit de prouver que $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]; +; \times)$ est un sous-anneau de $(\mathbb{R}; +; \times)$.

On a :

► $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est stable par la loi $+$: $(a + b\sqrt{2}) + (a' + b'\sqrt{2}) = ((a + a') + (b + b')\sqrt{2})$

Et $((a + a'); (b + b')) \in \mathbb{Z}^2$.

► $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ stable par la loi $\times$: $(a + b\sqrt{2}) \times (a' + b'\sqrt{2}) = ((aa' + 2bb') + (ab' + a'b)\sqrt{2})$

Et $((aa' + 2bb'); (ab' + a'b)) \in \mathbb{Z}^2$.

► $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ stable par passage à l'opposé : $-(a + b\sqrt{2}) = -a + (-b)\sqrt{2}$.

Et $(-a; -b) \in \mathbb{Z}^2$

► De plus, $1 \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, pour $a = 1$ et $b = 0$

Donc $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]; +; \times)$ est un sous-anneau de $(\mathbb{R}; +; \times)$

2) Posons $x = a + b\sqrt{2}$ et $y = a' + b'\sqrt{2}$.

En tenant compte de la formule pour le produit obtenue à la question précédente, on a :

$$N(xy) = (aa' + 2bb')^2 - 2(ab' + a'b)^2$$

$$= (aa')^2 - 2(ab')^2 - 2(a'b)^2 + 4(bb')^2$$

D'autre part,

$$N(x)N(y) = (a^2 - 2b^2)(a'^2 - 2b'^2)$$

$$= (aa')^2 - 2(a'b)^2 - 2(ab')^2 + 4(bb')^2$$

$$= N(xy)$$

Donc pour tous x, y de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, on a $N(xy) = N(x)N(y)$.

$$\text{Soit } x = a + b\sqrt{2}.$$

Supposons d'abord que x est inversible, d'inverse y .

Alors $N(xy) = N(1) = 1$, et donc $N(x)N(y) = 1$.

Puisque $N(x)$ et $N(y)$ sont tous les deux des entiers, on a nécessairement $N(x) = \pm 1$.

Réciproquement, si $N(x) = \pm 1$, alors, en utilisant la quantité conjuguée :

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2} = \pm(a - b\sqrt{2})$$

ce qui montre que $a + b\sqrt{2}$ est inversible, d'inverse $\pm(a - b\sqrt{2})$.

Exercice 9

Soit p un nombre premier. On note $\mathbb{Z}_p = \left\{ \frac{a}{b} / (a; b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* ; p \nmid b = 1 \right\}$.

- 1) Démontrer que $(\mathbb{Z}_p; +; \times)$ est un sous-anneau de $(\mathbb{Q}; +; \times)$.
- 2) Démontrer que pour tout nombre rationnel non nul x , alors $x \in \mathbb{Z}_p$ ou $x^{-1} \in \mathbb{Z}_p$.
- 3) Soit $(B; +; \times)$ un sous-anneau de $(\mathbb{Q}; +; \times)$ contenant $\mathbb{Z}_p$.

Démontrer que $B = \mathbb{Q}$ ou que $B = \mathbb{Z}_p$.

Corrigé

1) On remarque d'abord que

► $1 \in \mathbb{Z}_p$.

► Soit ensuite $x = \frac{a}{b}$ et $y = \frac{c}{d}$ deux éléments de $\mathbb{Z}_p$. Alors puisque $p \wedge b = 1$ et $p \wedge d = 1$, on a $p \wedge bd = 1$.

Mais puisque $x - y = \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$ et $x \times y = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$, on a $(x - y) \in \mathbb{Z}_p$ et $(xy) \in \mathbb{Z}_p$.

Ainsi, $(\mathbb{Z}_p; +; \times)$ est bien un sous-anneau de $(\mathbb{Q}; +; \times)$.

2) Soit $x = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, $x \neq 0$, écrit sous forme irréductible.

Si $x \in \mathbb{Z}_p$, c'est fini. Sinon, c'est que $p \nmid b$ (rappelons que p est premier) et puisque $a \wedge b = 1$, on a $p \wedge a = 1$. Ainsi, $x^{-1} = \frac{b}{a} \in \mathbb{Z}_p$.

3) On suppose que $B \neq \mathbb{Z}_p$

Soit $x \in B \setminus \mathbb{Z}_p$. Alors x s'écrit $x = \frac{a}{p^n b}$ avec $a \wedge b = 1$ et $p \wedge b = 1$.

En particulier, on sait que $y = \frac{p^{n-1}b}{a} \in \mathbb{Z}_p \subset B$, et puisque B est un sous-anneau,

$xy = \frac{1}{p} \in B$. Prenant les puissances de cet élément, on a $\frac{1}{p^k} \in B$ pour $k \geq 0$.

Finalement, considérons $r \in \mathbb{Q}; r \neq 0$.

On peut écrire $r = \frac{c}{p^m d}$, avec $p \wedge d = 1$

Alors $r = \frac{c}{d} \times \frac{1}{p^m} \in B$ (Car $\frac{c}{d} \in \mathbb{Z}_p \subset \mathbb{Q}$ et $\frac{1}{p^m} \in B$).

Donc $\mathbb{Q} \subset B$; par suite $B = \mathbb{Q}$

D'où si $(B; +; \times)$ un sous-anneau de $(\mathbb{Q}; +; \times)$ contenant $\mathbb{Z}_p$; on a $B = \mathbb{Q}$ ou que $B = \mathbb{Z}_p$.