EXERCICE 1 :

Déterminer les entiers relatifs n tels que $n-4$ divise $3n-17$.

CORRECTION :

Puisque $n-4$ divise $3n-17$ et que $n-4$ divise $n-4$, $n-4$ divise également $3n-17-3(n-4)=-5$. Or les diviseurs dans $\mathbb{Z}$ de -5 sont $-5, -1, 1, 5$.

Les valeurs possibles de $n-4$ sont donc ces valeurs, et donc on a $n \in \{-1, 3, 5, 9\}$.

Réciproquement, si $n=-1$, alors $n-4=-5$ divise $3n-17=-20$.

Si $n=3$, $n-4=-1$ divise $3n-17=-8$.

Si $n=5$, $n-4=1$ divise $3n-17=-2$.

Si $n=9$, $n-4=5$ divise $3n-17=10$.

En conclusion, les valeurs de n qui conviennent sont $-1, 3, 5$ et 9 .

EXERCICE 2:

Démontrer que, pour tout entier naturel n , $3^{2n+1} + 2^{4n+2}$ est divisible par 7.

CORRECTION :

Notons, pour $n \in \mathbb{N}$, la propriété $P(n)$: " $3^{2n+1} + 2^{4n+2}$ est divisible par 7". Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vérifiée.

Initialisation : On a $3^1 + 2^2 = 7$ qui est bien divisible par 7.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ est vraie ; et montrons que $P(n+1)$ est vraie. Alors, on écrit :

$$3^{2n+1} + 2^{4n+2} \equiv 0[7] \text{ (hypothèse de récurrence)}$$

$$\begin{aligned} \text{On a : } 3^{2(n+1)+1} + 2^{4(n+1)+2} &\equiv 3^{2n+3} + 2^{4n+6} [7] \\ &\equiv 3^2 \times 3^{2n+1} + 2^4 \times 2^{4n+2} [7] \\ &\equiv 9 \times 3^{2n+1} + 16 \times 2^{4n+2} [7] \\ &\equiv 2 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{4n+2} [7] \\ &\equiv 2 \times (3^{2n+1} + 2^{4n+2}) [7] \\ &\equiv 0[7] \end{aligned}$$

Ainsi, 7 divise $3^{2(n+1)+1} + 2^{4(n+1)+2}$ et donc $P(n+1)$ est vérifiée.

En conclusion : par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 3 :

On cherche à trouver les solutions modulo n de l'équation $ax \equiv b[n]$, où a, b, c sont trois entiers naturels (supérieurs ou égaux à 1). On note $d = a \wedge n$.

Justifier que l'équation admet une solution si et seulement si d divise b .

Dans cette question, on suppose que d divise b . On note x_0 une solution et on pose $n = dn'$.

Démontrer que l'ensemble des solutions de l'équation est $\{x_0 + qn'; q \in \mathbb{Z}\}$.

En déduire que l'équation admet exactement d solutions modulo n .

CORRECTION :

S'il existe une solution x , alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $ax = b + kn$. Mais, puisque $d | a$ et $d | n$, alors $d | b$. Réciproquement, supposons que : $d | b$. Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que : $au + nv = d$.

Écrivons $b = db'$ et multiplions l'égalité de Bézout par b' . On obtient : $a(ub') + n(vb') = db' = b$

Ainsi, $x = ub'$ est solution de l'équation.

■ Si x est solution, alors : $a(x - x_0) \equiv 0[n]$ et donc : $n | a(x - x_0)$. Notons également $a = da'$ et $n = dn'$ avec $n' \wedge a' = 1$.

Alors on $n' | a'(x - x_0)$. Puisque $n' \wedge a' = 1$, on en déduit que $n' | (x - x_0)$ et donc que $x = x_0 + qn'$, $q \in \mathbb{Z}$. Réciproquement, si $x = x_0 + qn'$, alors

$$ax \equiv b + qa'dn'[n] \text{ et } n/qa'dn'.$$

■ On remarque que

$$x_0 + qn' \equiv x_0 + rn'[n] \Leftrightarrow (q - r)n' \equiv 0[n]$$

$$\Leftrightarrow n | (q - r)n'$$

$$\Leftrightarrow d | (q - r)$$

Ainsi, les entiers $x_0, x_0 + n', \dots, x_0 + (d-1)n'$ sont tous différents modulo n , et tous les entiers $x_0 + qn'$ sont congrus, modulo n , à exactement un de ces entiers. On en déduit bien que l'équation admet exactement d solutions modulo n .

EXERCICE 4 :

On considère la suite (u_n) d'entiers naturels définie par $u_0 = 14$ et $u_{n+1} = 5u_n - 6$.

Quelle conjecture peut-on émettre sur les deux derniers chiffres de (u_n) ?

Montrer que pour tout entier naturel n , $u_{n+2} \equiv u_n [4]$.

En déduire que pour tout entier naturel k , on a $u_{2k} \equiv 2 [4]$ et $u_{2k+1} \equiv 0 [4]$.

a) Montrer que pour tout entier naturel n , on a $2u_n = 5^{n+2} + 3$.

b) En déduire que pour tout entier naturel n , on a $2u_n \equiv 28 [100]$.

Valider la conjecture émise à la première question.

CORRECTION :

En utilisant un tableur, on peut conjecturer que les deux derniers chiffres de u_n sont 14 si n est pair et 64 si n est impair.

$$\begin{aligned} \text{On a : } u_{n+2} &= 5u_{n+1} - 6 \\ &= 5(5u_n - 6) - 6 \\ &= 25u_n - 36 \end{aligned}$$

Écrivons cette égalité modulo 4. On trouve : $u_{n+2} \equiv u_n [4]$

puisque $25 \equiv 1 [4]$ et $-36 \equiv 0 [4]$. Le reste de la question se déduit par une récurrence assez

élémentaire.

a) On va prouver ce résultat par récurrence sur n . La propriété est vraie au rang 0. Si elle est vérifiée au rang n , alors

$$\begin{aligned} 2u_{n+1} &= 2(5u_n - 6) \\ &= 5(5^{n+2} + 3) - 12 \\ &= 5^{n+3} + 3 \end{aligned}$$

On aurait pu aussi utiliser la forme générale du terme d'une suite géométrique.

On commence par remarquer que, pour tout $p \geq 1$, alors $5^p \equiv 25[100]$. C'est en effet vrai pour $p = 1$, et si c'est vrai au rang p , alors

$$5^p \equiv 25[100] \Leftrightarrow 5^{p+1} \equiv 125[100] \\ \equiv 25[100].$$

Ainsi, pour tout entier naturel n ,

$$2u_n \equiv 5^{n+2} + 3[100] \\ \equiv 25 + 3[100] \\ \equiv 28[100].$$

D'après la question précédente, on sait que pour tout entier naturel k , on a : $2u_{2k} = 28 + 100p$ soit $u_{2k} = 14 + 50p$.

Si $p = 2m$ est pair, alors $u_{2k} = 14 + 100m$ et $u_{2k} \equiv 14[100]$.

$$\text{Si } p = 2m + 1 \text{ est impair, alors } u_{2k} = 14 + 50 + 100m = 64 + 100m \\ = (8 + 25m) \times 4 \Rightarrow u_{2k} \equiv 0[4]$$

et ceci contredit le résultat de la question

2. Ce n'est donc pas possible et on a bien $u_{2k} \equiv 14[100]$.

Pour les termes u_{2k+1} , la preuve de la conjecture est identique.

EXERCICE 5:

Le but de l'exercice est de déterminer tous les couples d'entiers $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ tels que $2^m - 3^n = 1$.

Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^n par 8 (on distinguera les cas n pair et n impair).

En déduire que si $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ est solution de $2^m - 3^n = 1$, alors $m \leq 2$.

Déterminer toutes les solutions de l'équation.

CORRECTION:

On remarque que $3^2 = 9 \equiv 1[8]$. En utilisant les propriétés sur les congruences, on trouve que,

■ si $n = 2k$ est pair,

$$3^{2k} = (3^2)^k \equiv 1^k[8] \equiv 1[8].$$

■ si $n = 2k + 1$ est impair,

$$3^{2k+1} = (3^2)^k \times 3 \equiv 1^k \times 3[8] \equiv 3[8].$$

Le reste de la division euclidienne de 3^n par 8 est donc égal à 1 si n est pair et à 3 si n est impair.

Supposons qu'il existe une solution avec $m \geq 3$. Alors $2^m = 2^{m-3} \times 2^3 = 8 \times 2^{m-3} \equiv 0[8]$.

On en déduit que

$$2^m - 3^n \equiv 1[8] \Rightarrow -3^n \equiv 1[8].$$

Mais ceci est impossible, puisque si n est pair, $-3^n \equiv -1[8]$ et -1 n'est pas congru à 1 modulo 8, et si n est impair, $-3^n \equiv -3[8] \equiv 5[8]$ et 5 n'est pas congru à 1 modulo 8.

Pour $m = 0$, on a $2^m - 3^n = 1 \Leftrightarrow -3^n = 0$, ce qui n'est jamais le cas.

Si $m = 1$, on a : $2^m - 3^n = 1 \Leftrightarrow 3^n = 1 \Leftrightarrow n = 0$. Le couple $(1, 0)$ est donc solution.

Si $m = 2$, alors $2^m - 3^n = 1 \Leftrightarrow 3^n = 3 \Leftrightarrow n = 1$. Le couple $(2, 1)$ est solution. Donc les solutions sont les couples $(1, 0)$ et $(2, 1)$.

EXERCICE 6 :

Soit n un entier qui est le produit de k entiers distincts, $k \geq 1$. Démontrer que n admet au moins $\frac{k(k-1)}{2} + 1$ diviseurs distincts.

CORRECTION :

Notons, pour $k \geq 1$, $P(k)$ l'hypothèse suivante : "tout entier $n \geq 1$ qui est le produit de k entiers distincts possède au moins $\frac{k(k-1)}{2} + 1$ diviseurs distincts". Prouvons par récurrence sur k que, pour tout $k \geq 1$, $P(k)$ est vraie.

Initialisation : $P(1)$ est vraie, car n admet alors au moins un diviseur (lui-même), et si $k = 1$

$$\frac{k(k-1)}{2} + 1 = 1.$$

Hérédité : soit $k \geq 1$ tel que $P(k)$ est vraie et prouvons $P(k+1)$. Soit n un produit de $k+1$ entiers

distincts. Alors n s'écrit $n = a_1 a_2 \cdots a_{k+1}$ où $a_1 < a_2 < \cdots < a_{k+1}$. Posons $m = \frac{n}{a_{k+1}}$. Alors m est le produit

de k entiers distincts, et donc m admet au moins $\frac{k(k-1)}{2} + 1$ diviseurs distincts. De plus, si d est un diviseur

de m , alors $a_{k+1} d$ est un diviseur de n . Notons A les diviseurs de m et $B = \{a_{k+1} d; d \in A\}$. Alors,

puisque $a_1 < a_{k+1}, \dots, a_k < a_{k+1}$, les éléments $a_1, \dots, a_k$ ne sont pas éléments de B alors qu'ils sont éléments de A . On sait aussi que A et B ont le même cardinal. Dans B , il y a donc au moins k éléments qui ne sont pas dans A (puisque dans A , il y a au moins k éléments qui ne sont pas dans B). Ainsi, on a trouvé au moins k diviseurs supplémentaires de n . Ainsi, n possède au moins

$$\frac{k(k-1)}{2} + k = \frac{k(k+1)}{2} \text{ diviseurs. Ceci prouve que } P(k+1) \text{ est vraie.}$$

Conclusion : par le principe de récurrence, $P(k)$ est vraie pour tout entier k .

EXERCICE 7:

Déterminer, suivant les puissances de $n \in \mathbb{N}$, le reste de la division euclidienne de 2^n par 5.

Quel est le reste de la division par 5 de 1357^{2013} ?

CORRECTION

La méthode pour ce type d'exercice est toujours la même et est très importante à savoir. On commence par rechercher le premier entier $k \geq 1$ tel que $2^k \equiv 1[5]$. On va ensuite raisonner modulo k . On trouve successivement :

$$2^1 \equiv 2[5], 2^2 \equiv 4[5], 2^3 \equiv 3[5], 2^4 \equiv 1[5].$$

On va donc classer les entiers n modulo 4. En effet, si $n = 4q + r$, alors sachant que $2^{4q} \equiv 1^q[5]$ soit $2^{4q} \equiv 1[5]$, on trouve que $2^n \equiv 2^r[5]$

Ainsi, on obtient

$$\text{Si } n \equiv 0[4], \text{ alors } 2^n \equiv 1[5];$$

$$\text{Si } n \equiv 1[4], \text{ alors } 2^n \equiv 2[5];$$

$$\text{Si } n \equiv 2[4], \text{ alors } 2^n \equiv 4[5];$$

$$\text{Si } n \equiv 3[4], \text{ alors } 2^n \equiv 3[5];$$

On commence par effectuer la division euclidienne de 1357 par 5, et on trouve que $1357 \equiv 2[5]$, d'où $1357^{2013} \equiv 2^{2013}[5]$. De plus, $2013 \equiv 1[4]$. On en déduit que $1357^{2013} \equiv 2^1 \equiv 2[5]$.