exercice 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \frac{e^x}{x^3}$ et C_f sa courbe représentative.

- Etudier les variations de f sur $\mathbb{R}^*$.
- Montrer que la droite (Δ) d'équation $x = 3$ n'est pas un axe de symétrie de la courbe C_f .
- Montrer que C_f admet une unique tangente parallèle à l'axe (Ox) et elle est obtenue au point d'abscisse 3.
- La tangente à C_f au point d'abscisse 1 a pour équation : $y = -2ex + 3e$.

Correction

a. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et on a :

$$f'(x) = \frac{x^3 e^x - 3x^2 e^x}{(x^3)^2} = \frac{x^2 e^x (x-3)}{x^6} = \frac{e^x (x-3)}{x^4}$$

Etudions le signe de f' :

f' est de même signe que $(x-3)$; donc f' est positive sur l'intervalle $[3; +\infty[$ et négative sur l'intervalle $]-\infty; 0[\cup]0; 3]$ d'où : f est croissante sur l'intervalle $[3; +\infty[$ et décroissante sur l'intervalle $]-\infty; 0[\cup]0; 3]$.

b. Si la droite (Δ) on doit avoir les deux conditions de symétrie satisfaites ;

$$\begin{cases} 3-x \in \mathbb{R}^* \Leftrightarrow 3+x \\ f(3-x) = f(3+x) \end{cases}$$

Or aucune condition n'est satisfaite car pour $x = 3$ ($6 \in \mathbb{R}^*$ mais $0 \notin \mathbb{R}^*$) et aussi $f(3-x) \neq f(3+x)$ (facile à vérifier)

- f' s'annule uniquement pour $x = 3$ donc C_f admet une unique tangente parallèle à l'axe (Ox) et elle est obtenue au point d'abscisse $x = 3$.
- La tangente à C_f au point d'abscisse 1 a pour équation : $y = f'(1)(x-1) + f(1)$ donc :

$$y = \frac{e^1(1-3)}{1^4}(x-1) + \frac{e^1}{1^3} = -2e(x-1) + e$$

$$y = -2ex + 3e$$

exercice 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{e^{-x}}{x^2+1} - \frac{x}{2}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

- Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- Etudier les variations de f , et dresser son tableau de variation.
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$, Donner un encadrement de cette solution d'amplitude $0,5$.
- Montrer que la droite (D) d'équation $y = -\frac{x}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

- 5- Etudier la position relative de $\mathcal{C}$ et (D).
6- Construire $\mathcal{C}$ et (D) dans un même repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

Correction

1- ■ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{-x}}{x^2+1} - \frac{x}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{e^x(x^2+1)} - \frac{x}{2} \right) = -\infty$ (car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{e^x(x^2+1)} \right) = 0$)

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

■ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{-x}}{x^2+1} - \frac{x}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{-x}}{(-x)^2} \times \frac{x^2}{(x^2+1)} - \frac{x}{2} \right) = +\infty$ (car $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{-x}}{(-x)^2} \right) = +\infty$)

Donc : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

- 2- Calculons $f'(x)$ pour tout x dans $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \left(\frac{e^{-x}}{x^2+1} - \frac{x}{2} \right)' = \frac{-e^{-x}(x^2+1) - 2xe^{-x}}{(x^2+1)^2} - \frac{1}{2} = \frac{-e^{-x}(x^2+2x+1)}{(x^2+1)^2} - \frac{1}{2} = \frac{-e^{-x}(x+1)^2}{(x^2+1)^2} - \frac{1}{2}$$

d'où : $f'(x) = - \left(\frac{e^{-x}(x+1)^2}{(x^2+1)^2} + \frac{1}{2} \right)$

Donc : $(\forall x \in \mathbb{R}) f'(x) < 0$ on en conclue que la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Tableau de variation de f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

- 3- Puisque la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ alors

$f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[=]-\infty; +\infty[\Rightarrow (\exists! \alpha \in \mathbb{R}) / f(\alpha) = 0$. Donc l'équation

$f(x) = 0$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$. Et on a $f(0) = 1$ et

$f(1) = \frac{1}{2e} - \frac{1}{2} < 0$ ($2e > 2$) Donc $\alpha \in]0; 1[$.

De plus on a $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{\frac{5}{4}e} - \frac{1}{2} = \frac{7}{10e} > 0$. DONC $\alpha \in \left] \frac{1}{2}; 1 \right[$

4- On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \left(-\frac{x}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{-x}}{x^2+1}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{e^x(x^2+1)}\right) = 0$

Donc la droite (D) d'équation $y = -\frac{x}{2}$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}$ au voisinage de $+\infty$.

5- On a $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f(x) - \left(-\frac{x}{2}\right) = \left(\frac{e^{-x}}{x^2+1}\right) > 0$ donc $\mathcal{C}$ est au dessus de la droite (D) sur $\mathbb{R}$.

6- Construction graphique