guessmaths

Correction examen nationale 2015 Session de Rattrapage

2^{ème} Bac SM A et B

Exercice 1:

Première Partie

$$\begin{aligned}
1) a) \text{ Soit } (x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x * y &= x + y - e^{xy} + 1 \\
&= y + x - e^{yx} + 1 \\
&= y * x
\end{aligned}$$

Donc la loi * est commutative.

b) Soit a l'élément neutre de la loi * dans $\mathbb{R}$; alors :

$$\begin{aligned}
(\forall x \in \mathbb{R}) ; x * a = x &\Leftrightarrow x + a - e^{xa} + 1 = x \\
&\Leftrightarrow e^{xa} = a + 1 \\
&\Leftrightarrow xa = \ln(a + 1) \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ \ln(a + 1) \end{cases} \text{ par identification} \\
&\Leftrightarrow a = 0
\end{aligned}$$

Donc 0 est l'élément neutre de la loi * dans $\mathbb{R}$

2) L'équation $3 + x - e^{2x} = 0$ admet deux solutions distinctes α et β dans $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\text{Alors on a : } \begin{cases} 3 + \alpha - e^{2\alpha} = 0 \\ 3 + \beta - e^{2\beta} = 0 \end{cases} \text{ et } \alpha \neq \beta \\
\Rightarrow \begin{cases} 2 + \alpha - e^{2\alpha} + 1 = 0 \\ 2 + \beta - e^{2\beta} + 1 = 0 \end{cases} \text{ et } \alpha \neq \beta \\
\Rightarrow \begin{cases} 2 * \alpha = \alpha * 2 = 0 \\ 2 * \beta = \beta * 2 = 0 \end{cases} \text{ et } \alpha \neq \beta \\
\Rightarrow \begin{cases} (\alpha * 2) * \beta = 0 * \beta = \beta \\ \alpha * (2 * \beta) = \alpha * 0 = \alpha \end{cases} \text{ et } \alpha \neq \beta
\end{aligned}$$

Donc par ce contre-exemple on montre que la loi * n'est pas associative.

Deuxième Partie

1) F est une partie non vide de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ car $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in F$

Soient $M(x, y)$ et $M(x', y')$ deux éléments de F ; et $\alpha \in \mathbb{R}$; on a :

$$\begin{aligned}
\alpha \cdot M(x, y) + M(x', y') &= \alpha \cdot \begin{pmatrix} x & -2y \\ \frac{y}{2} & x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x' & -2y' \\ \frac{y'}{2} & x' \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \alpha x + x' & -2\alpha y - 2y' \\ \frac{\alpha y + y'}{2} & \alpha x + x' \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} (\alpha x + x') & -2(\alpha y + y') \\ \frac{(\alpha y + y')}{2} & (\alpha x + x') \end{pmatrix} \\
&= M(\alpha x + x', \alpha y + y') \in F
\end{aligned}$$

Ainsi pour tous $M(x, y)$ et $M(x', y')$ éléments de F et tout $\alpha \in \mathbb{R}$: on a :

$$(\alpha \cdot M(x, y) + M(x', y')) \in F$$

Donc F est stable pour les combinaisons linéaires par suite $(F, +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$.

2) Soient $M(x, y)$ et $M(x', y')$ deux éléments de F on a :

$$\begin{aligned}
M(x, y) \times M(x', y') &= \begin{pmatrix} x & -2y \\ \frac{y}{2} & x \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x' & -2y' \\ \frac{y'}{2} & x' \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} xx' - yy' & -2xy' - 2x'y \\ \frac{x'y}{2} + \frac{xy'}{2} & -yy' + xx' \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} (xx' - yy') & -2(x'y + xy') \\ \frac{(x'y + xy')}{2} & (xx' - yy') \end{pmatrix} \\
&= M(xx' - yy', x'y + xy') \in F
\end{aligned}$$

Donc F est stable dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$

3) a) Soient $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ deux éléments de $\mathbb{C}$ on a :

$$\begin{aligned}
\varphi(z \times z') &= \varphi((x + iy) \times (x' + iy')) \\
&= \varphi((xx' - yy') + i(xy' + x'y)) \\
&= M(xx' - yy', xy' + x'y)
\end{aligned}$$

D'autre part d'après la question 2) on a : $M(x, y) \times M(x', y') = M(xx' - yy', x'y + xy')$

Donc $\varphi(z) \times \varphi(z') = \mathcal{M}(x, y) \times \mathcal{M}(x', y') = \mathcal{M}(xx' - yy', x'y + xy')$

D'où $\varphi(z \times z') = \varphi(z) \times \varphi(z')$

Par suite φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(F, \times)$.

b) Soit $\mathcal{M}(a, b) = \begin{pmatrix} a & -2b \\ \frac{b}{2} & a \end{pmatrix}$ un élément de F^* c-à-d $(a, b) \neq (0, 0)$; résolvons

l'équation $\varphi(z) = \mathcal{M}(a, b)$

On a : $\varphi(z) = \mathcal{M}(a, b) \Leftrightarrow \mathcal{M}(x, y) = \mathcal{M}(a, b)$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & -2y \\ \frac{y}{2} & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -2b \\ \frac{b}{2} & a \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow x = a \text{ et } -2y = -2b \text{ et } \frac{y}{2} = \frac{b}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = a \text{ et } y = b$$

l'équation $\varphi(z) = \mathcal{M}(a, b)$ admet une solution unique dans $\mathbb{C}^*$; donc φ de $\mathbb{C}^*$ vers F^* .

D'où $\varphi(\mathbb{C}^*) = F^*$

c) d'après ce qui précède φ est un isomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(F^*, \times)$.

Comme $(\mathbb{C}^*, \times)$ est un groupe commutatif alors $\varphi((\mathbb{C}^*, \times)) = (F^*, \times)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $\varphi(1 + 0i) = \mathcal{M}(1, 0) = I$

Et le symétrique de $(x + iy)$ dans $\mathbb{C}^*$ est $\left(\frac{x}{x^2 + y^2} - i \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \right)$; donc le symétrique

de $\mathcal{M}(x, y)$ est $\varphi \left(\frac{x}{x^2 + y^2} - i \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \right) = \mathcal{M} \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right)$

4) vérifions les assertions suivantes :

- $(F, +)$ est un groupe abélien d'élément neutre $\mathcal{M}(0, 0)$.
- $(F^*, \times)$ est un groupe.
- $\times$ est distributive par rapport à $+$.
- $\times$ est commutative dans F .

Ce qui est aisément facile à vérifier.

- $(F, +)$ est un groupe commutatif puisque $(F, +)$ est un sous-groupe du groupe abélien $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +)$
 - $(F^*, \times)$ est un groupe démontré dans 3)c).
 - $\times$ est distributive par rapport à $+$ dans $(F, \times)$ car elle est distributive par rapport à $+$ dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.
 - $\times$ est commutative dans F démontré dans 3)c).
- Donc $(F, +, \times)$ est un corps commutatif.

Exercice 2 :

Première Partie

1) 13 est premier et $a \wedge 13 = 1$; d'après le petit théorème de FERMAT On a :
 $a^{12} \equiv 1[13]$; d'où $(a^{12})^{168} \equiv 1^{168}[13]$

Ainsi $a^{2016} \equiv 1[13]$

2) (E) : $x^{2015} \equiv 2[13]$

a) soit x solution de (E) ; posons $x \wedge 13 = d$

Comme 13 est premier ; alors $d = 13$ ou $d = 1$

- Supposons que $d = 13$; donc $13 \mid x$

Ainsi $(\exists k \in \mathbb{Z}) \mid x = 13k$; et x solution de (E) ; alors : $(13k)^{2015} \equiv 2[13]$ [1]

Et $13k \equiv 0[13]$; donc $(13k)^{2015} \equiv 0[13]$ [2]

De [1] et [2] ; on obtient $2 \equiv 0[13]$; c'ad $13 \mid 2$

Ce qui est absurde par suite $d = 1$; donc $x \wedge 13 = 1$

b) soit x une solution de (E) ; $x^{2015} \equiv 2[13] \Rightarrow x \cdot x^{2015} \equiv 2x[13]$ [3] ; et

$x \equiv 1[13] \Rightarrow x^{2016} \equiv 1[13]$ [4] (d'après la question précédente)

de [3] et [4] on obtient $2x \equiv 1[13] \Rightarrow 2x - 14 \equiv 0[13]$

$$\Rightarrow 2(x - 7) \equiv 0[13]$$

$$\Rightarrow x - 7 \equiv 0[13] \quad (\text{d'après Gauss car } 2 \wedge 13 = 1)$$

$$\Rightarrow x \equiv 7[13]$$

3) x est solution de (E) donc $x \equiv 7[13] \Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}) \mid x = 7 + 13k$

Réciproquement si $x = 7 + 13k$ avec $k \in \mathbb{Z}$; On a :

$$x \equiv 7[13] \Rightarrow \begin{cases} x^2 \equiv 10[13] \\ x^3 \equiv 5[13] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^4 \equiv 9[13] \\ x^7 \equiv -1[13] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^{11} \equiv 2[13] \\ x^{12} \equiv 1[13] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^{11} \equiv 2[13] \\ x^{12 \times 167} \equiv 1[13] \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^{12 \times 167 + 11} \equiv 2[13]$$

$$\Rightarrow x^{2015} \equiv 2[13]$$

D'où $x = 7 + 13k$ avec $k \in \mathbb{Z}$ est solution de (E)

Donc l'ensemble des solutions de (E) est $S = \{x = 7 + 13k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Deuxième Partie

1) Soit n le numéro que porte la boule tirée ; pour que n soit solution de l'équation (E) il faut qu'il s'écrive $n = 7 + 13k$ avec $k \in \mathbb{Z}$

On sait que : $1 \leq n \leq 50 \Rightarrow 1 \leq 7 + 13k \leq 50$ avec $k \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow -6 \leq 13k \leq 43 \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \frac{-6}{13} \leq k \leq \frac{43}{13} \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow -0,6 \leq k \leq 3,3 \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow k \in \{0; 1; 2; 3\}$$

Donc pour que n soit solution de l'équation (E) ; n doit prendre les valeurs suivantes :

7; 20; 33 ou 46 c-à-d $n \in \{7 + 13k \mid k \in \{0; 1; 2; 3\}\}$

2) Soit A l'événement « Obtenir une boule qui porte l'un des numéros 7; 20; 33 ou 46 »

$$\text{Donc } p(A) = \frac{\text{Card}A}{\text{Card}\Omega} = \frac{4}{50} = \frac{2}{25}$$

L'expérience est répétée 3 fois dans les mêmes conditions donc on est dans les conditions de

Bernouille de paramètres $n = 3$ et $p = \frac{2}{25}$; alors la probabilité que l'événement A soit

$$\begin{aligned}
 \text{réalisé exactement 2 fois est } p(A \text{ "2 fois"}) &= C_3^2 \left(\frac{2}{25}\right)^2 \times \left(1 - \frac{2}{25}\right)^{3-2} \\
 &= 3 \times \frac{4}{25^2} \times \frac{23}{25} \\
 &= \frac{12 \times 23}{25^3} \\
 &= \frac{276}{15625}
 \end{aligned}$$

Exercice 3 :

1) $(E) : z^2 - (1+i)z + 2 + 2i = 0$

a) le discriminant de l'équation (E) est : $\Delta = (1+i)^2 - 4(2+2i) = 0$

$$\begin{aligned}
 &= 2i - 8 - 8i \\
 &= -8 - 6i \\
 &= (1^2 - 2 \times 3i + (3i)^2) \\
 &= (1-3i)^2
 \end{aligned}$$

b) Donc les solutions de (E) sont :

$$z_1 = \frac{(1+i) - (1-3i)}{2} = 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{(1+i) + (1-3i)}{2} = 1-i$$

c) On a : $\frac{z_1}{z_2} = \frac{2i}{1-i}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2i(1+i)}{2} \\
 &= i(1+i) \\
 &= e^{\frac{i\pi}{2}} \times \sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{4}} \\
 &= \sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}}
 \end{aligned}$$

Donc $\frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}}$

2) a) E est milieu du segment $[AB]$; alors $\text{aff}(E) = e$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{z_1 + z_2}{2} \\
 &= \frac{2i + 1 - i}{2}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

Donc $e = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

b) Soit r la rotation de centre A et d'angle $\left(-\frac{\pi}{2}\right)$; on a :

$$r(E) = C \Leftrightarrow (c - z_1) = (e - z_1)e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

$$\Leftrightarrow c = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i - 2i\right) \times (-i) + 2i$$

$$\Leftrightarrow c = \left(-\frac{1}{2}i - \frac{3}{2}\right) + 2i$$

$$\Leftrightarrow c = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$$

c) On a :

$$\frac{z_2 - d}{c - d} \times \frac{c - z_1}{z_2 - z_1} = \frac{1 - i - 1 - \frac{3}{2}i}{-\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i - 1 - \frac{3}{2}i} \times \frac{-\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i - 2i}{1 - i - 2i}$$

$$= \frac{-\frac{5}{2}i}{-\frac{5}{2}} \times \frac{-\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i}{1 - 3i}$$

$$= \frac{1}{2}i \times \frac{-3 - i}{1 - 3i}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1 - 3i}{1 - 3i}$$

$$= \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$$

Donc les points A ; B ; C et D sont alignés ou cocycliques.

- On a : $\frac{z_2 - z_1}{c - z_1} = \frac{1 - i - 2i}{-\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i - 2i}$
$$= \frac{1 - 3i}{-\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \times \frac{1-3i}{-3-i} \\
&= 2i \times \frac{-i-3}{-3-i} \\
&= 2i \in i\mathbb{R}
\end{aligned}$$

Donc les points A ; B et C ne sont pas colinéaires.

$$\begin{aligned}
\text{D'autre part on a : } \frac{z_2 - d}{z_1 - d} &= \frac{1-i-1-\frac{3}{2}i}{2i-1-\frac{3}{2}i} \\
&= \frac{-\frac{5}{2}i}{-1+\frac{1}{2}i} \\
&= \frac{5i(2+i)}{5} \\
&= \frac{5i(2+i)}{5} \\
&= -1+2i \notin \mathbb{R}
\end{aligned}$$

Donc les points A ; B et D ne sont pas colinéaires

Par suite les points A ; B ; C et D ne sont pas colinéaires ; d'où ils sont cocycliques.

Exercice 4 :

Pour tout n entier naturel ; $f_n(x) = \frac{1}{1+e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} (\forall x \in \mathbb{R})$

$$1) a) \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} = 1 \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{3}{2}(x-n)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{3}{2}n} e^{-\frac{3x}{2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{3}{2}n}}{(e^x)^{\frac{3}{2}}} = 0)$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1+e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} = 0 \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\frac{3}{2}(x-n)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{3}{2}n} e^{-\frac{3x}{2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{\frac{3}{2}n}}{(e^x)^{\frac{3}{2}}} = +\infty)$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = 0 \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\frac{3}{2}(x-n)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{3}{2}n} e^{-\frac{3x}{2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{\frac{3}{2}n}}{(e^x)^{\frac{3}{2}}} = +\infty)$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = 0$$

Interprétation géométrique

(C_n) admet deux asymptote horizontale une d'équation $y = 1$ au voisinage de $+\infty$ et une d'équation $y = 0$ (càd l'axe des abscisses) au voisinage de $-\infty$

b) f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme l'inverse d'une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et qui ne

$$\begin{aligned} \text{s'annule jamais ; et pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ on a : } f_n'(x) &= -\frac{\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)'}{\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)^2} \\ &= -\frac{\left(-\frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)}{\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)^2} \\ &= \frac{3e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}{2\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)^2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in \mathbb{R}) ; f_n'(x) = \frac{3e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}{2\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)^2}$$

c) On a : $f_n'(x) > 0 ; (\forall x \in \mathbb{R})$

Donc f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2) a) On a : $\bullet x \in \mathbb{R}$ alors $(2n-x) \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \bullet f_n(2n-x) + f_n(x) &= \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(2n-x-n)}} + \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} \\ &= \frac{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} + 1 + e^{\frac{3}{2}(x-n)}}{\left(1 + e^{\frac{3}{2}(x-n)}\right)\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} + e^{\frac{3}{2}(x-n)}}{1 + e^{\frac{3}{2}(x-n)} + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} + 1} \\
 &= 2 \times \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Donc le point $I_n \left(n, \frac{1}{2} \right)$ est un centre de symétrie pour la courbe (C_n)

b) Construction de la courbe (C_1)

c) Soit Δ l'aire en cm^2 de la partie du plan délimitée par (C_1) et les droites d'équations $x = 0$; $x = 1$ et $y = 0$

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } \Delta &= \int_0^1 |f_n(x)| dx \\
 &= \int_0^1 f_n(x) dx \quad (\text{car } f_n(x) > 0 \text{ sur } \mathbb{R}) \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-1)}} dx \\
 &= \int_0^1 \frac{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-1)} - e^{-\frac{3}{2}(x-1)}}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-1)}} dx \\
 &= \int_0^1 1 + \frac{2 \left(-\frac{3}{2} e^{-\frac{3}{2}(x-1)} \right)}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-1)}} dx \\
 &= \left[x + \frac{2}{3} \ln \left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-1)} \right) \right]_0^1 \\
 &= 1 + \frac{2}{3} \left(\ln 2 - \ln \left(1 + e^{\frac{3}{2}} \right) \right)
 \end{aligned}$$

$$= 1 + \frac{2}{3} \ln \left(\frac{2}{1 + e^{\frac{3}{2}}} \right)$$

$$\text{Donc } A = 1 + \frac{2}{3} \ln \left(\frac{2}{1 + e^{\frac{3}{2}}} \right) \quad (u.a)$$

3) a) Pour $n > 0$ on considère la fonction g_n définie sur $\mathbb{R}$ par : $g_n(x) = f_n(x) - x$
 g_n est continue dérivable sur $\mathbb{R}$; comme somme de deux fonctions qui le sont.

$$(\forall x \in \mathbb{R}) ; g'_n(x) = f'_n(x) - 1$$

$$\begin{aligned} &= \frac{3e^{-\frac{3}{2}(x-n)} - 2 \left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} \right)^2}{2 \left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} \right)^2} \\ &= \frac{3e^{-\frac{3}{2}(x-n)} - 2 \left(1 + 2e^{-\frac{3}{2}(x-n)} + e^{-3(x-n)} \right)^2}{2 \left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} \right)^2} \\ &= \frac{3e^{-\frac{3}{2}(x-n)} - 2 - 4e^{-\frac{3}{2}(x-n)} - 2e^{-3(x-n)}}{2 \left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} \right)^2} \\ &= \frac{\left(2 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} + 2e^{-3(x-n)} \right)}{2 \left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} \right)^2} < 0 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in \mathbb{R}) ; g'_n(x) < 0$$

D'où g_n est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$; de plus

$$\begin{aligned} g_n]0, n[&=]g_n(n), g_n(0)[\\ &=]f_n(n) - n, f_n(0) - 0[\\ &= \left[\frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(n-n)}} - n, \frac{1}{1 + e^{\frac{3}{2}}} \right] \\ &= \left[\frac{1}{2} - n, \frac{1}{1 + e^{\frac{3}{2}}} \right] \end{aligned}$$

Et $0 \in \left] \frac{1}{2} - n, \frac{1}{1 + e^{\frac{3}{2}n}} \right[$; alors d'après TVI l'équation $g_n(x) = 0$ (càd $f_n(x) = x$)

admet une unique solution u_n dans $]0, n[$.

$$b) (\forall n \in \mathbb{N}^*) (\forall x \in \mathbb{R}) ; \text{ on a : } f_{n+1}(x) - f_n(x) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n-1)}} - \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}$$

$$= \frac{1}{1 + e^{\frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}} - \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}$$

$$\text{On a : } e^{\frac{3}{2}} > 1 \Leftrightarrow e^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{3}{2}(x-n)} > e^{-\frac{3}{2}(x-n)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1 + e^{\frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}} < \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1 + e^{\frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}} - \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} < 0$$

$$\Leftrightarrow f_{n+1}(x) < f_n(x)$$

c) pour $x = u_{n+1}$; on a $f_{n+1}(u_{n+1}) < f_n(u_{n+1})$; et $f_{n+1}(u_{n+1}) = n+1$ donc $f_n(u_{n+1}) > n+1$

et $f_n(u_n) = n$; d'où $f_n(u_{n+1}) > f_n(u_n)$

Comme f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; donc $u_{n+1} > u_n$

D'où la suite (u_n) est strictement croissante.

Et comme (u_n) est majorée par n ; alors elle est convergente.

d) On a : $f_n(u_n) = u_n \Leftrightarrow \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(u_n-n)}} = u_n$; Soit $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$; on obtient :

$$\frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(l-n)}} = l \text{ et comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{3}{2}(l-n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(e^{-\frac{3}{2}l} \times e^{\frac{3}{2}n} \right) = +\infty$$

$$\Rightarrow l = 0$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Exercice 5:

$$g(x) = \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt ; (\forall x \in \mathbb{R}^*)$$

1) on a : • $(\forall x \in \mathbb{R}^*)$ alors $(-x \in \mathbb{R}^*)$

• $g(-x) = \int_{-x}^{-3x} \frac{\cos t}{t} dt$; on pose le changement de variable $u = -t$ alors

$$\begin{aligned} g(-x) &= \int_{-x}^{-3x} \frac{\cos t}{t} dt \\ &= \int_x^{3x} \frac{\cos(-u)}{-u} (-du) \quad t = -x \text{ alors } u = x \text{ et } dt = -du \\ &= \int_x^{3x} \frac{\cos u}{u} du \\ &= g(x) \end{aligned}$$

Donc g est une fonction paire.

2) Soit φ la fonction définie par : $\varphi(x) = \frac{\cos x}{x}$; et $a \in]0; +\infty[$

Alors φ est continue sur $]0; +\infty[$ (comme quotient de deux fonctions continues sur $]0; +\infty[$ et dont le dénominateur ne s'annule pas sur $]0; +\infty[$) ; donc φ admet une primitive sur

$]0; +\infty[$ qui s'annule en a définie comme suit : $\psi(x) = \int_a^x \frac{\cos t}{t} dt$

$$\begin{aligned} \text{D'où } g(x) &= \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt \\ &= \int_x^a \frac{\cos t}{t} dt + \int_a^{3x} \frac{\cos t}{t} dt \\ &= -\int_a^x \frac{\cos t}{t} dt + \int_a^{3x} \frac{\cos t}{t} dt \\ &= \psi(3x) - \psi(x) \end{aligned}$$

D'autre part la fonction $x \mapsto \psi(x)$ est dérivable sur $]0; +\infty[$; ainsi que la fonction $x \mapsto \psi(3x)$

Donc g est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a pour tout $x \in]0; +\infty[$: $g'(x) = 3\psi'(3x) - \psi'(x)$

Et $\psi'(x) = \varphi(x)$; d'où : $g'(x) = 3\varphi(3x) - \varphi(x)$

$$\begin{aligned} &= 3x \frac{\cos(3x)}{3x} - \frac{\cos x}{x} \\ &= \frac{\cos(3x) - \cos x}{x} \end{aligned}$$

Donc $(\forall x \in]0; +\infty[) ; g'(x) = \frac{\cos(3x) - \cos x}{x}$

3) a) Calculons $\int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt$ en utilisant une intégration par parties.

On pose :
$$\begin{cases} u = \frac{1}{t} & \text{alors } u' = -\frac{1}{t^2} \\ v' = \cos t & \text{alors } v = \sin t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt &= \left[\frac{1}{t} \times \sin t \right]_x^{3x} - \int_x^{3x} \left(-\frac{1}{t^2} \times \sin t \right) dt \\ &= \frac{\sin(3x)}{3x} - \frac{\sin x}{x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \\ &= \frac{\sin(3x)}{3x} - \frac{\sin x}{x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \\ &= \frac{\sin(3x) - 3\sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \end{aligned}$$

b) On a pour tout $x > 0$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{\sin(3x) - 3\sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \Rightarrow |g(x)| = \left| \frac{\sin(3x) - 3\sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \right| \\ &\Rightarrow |g(x)| \leq \left| \frac{\sin(3x)}{3x} \right| + \left| \frac{\sin x}{x} \right| + \left| \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \right| \\ &\Rightarrow |g(x)| \leq \left| \frac{\sin(3x)}{3x} \right| + \left| \frac{\sin x}{x} \right| + \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \end{aligned}$$

D'autre part : $t \geq x \Rightarrow t^2 \geq x^2$

$$\Rightarrow \frac{1}{t^2} \leq \frac{1}{x^2} \quad \text{et } |\sin t| \leq 1$$

$$\text{Donc } \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| \leq \frac{1}{x^2} \Rightarrow \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \leq \int_x^{3x} \frac{1}{t^2} dt$$

$$\Rightarrow \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \leq -\frac{1}{3x} - \left(-\frac{1}{x}\right)$$

$$\Rightarrow \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \leq \frac{2}{3x}$$

$$\text{Et } \left| \frac{\sin(3x)}{3x} \right| \leq \frac{1}{3x} ; \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{x}$$

$$\text{D'où } |g(x)| \leq \frac{1}{3x} + \frac{1}{x} + \frac{2}{3x} \Rightarrow |g(x)| \leq \frac{6}{3x} = \frac{2}{x}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$; alors par encadrement $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

4) a) pour tout $x > 0$; et $t \in [x, 3x]$; on considère la fonction $h(t) = 1 - t - \cos t$

Alors h est dérivable et pour tout $t > 0$; on a : $h'(t) = -1 + \sin t < 0$

Donc h est décroissante ; par suite $t > 0$; on a : $h(t) \leq h(0)$ et $h(0) = 0$

$$\text{D'où pour tout } t > 0 : \bullet \ 1 - \cos t \leq t \Rightarrow \frac{1 - \cos t}{t} \leq 1$$

$$\Rightarrow \int_x^{3x} \frac{1 - \cos t}{t} dt \leq \int_x^{3x} 1 dt$$

$$\Rightarrow \int_x^{3x} \frac{1 - \cos t}{t} dt \leq 2x$$

$$\bullet \ \frac{1 - \cos t}{t} \geq 0 \Rightarrow \int_x^{3x} \frac{1 - \cos t}{t} dt \geq 0$$

$$\text{Conclusion : } (\forall x > 0) ; 0 \leq \int_x^{3x} \frac{1 - \cos t}{t} dt \leq 2x \quad \boxed{1}$$

$$\text{b) pour tout } x > 0 ; \text{ on a : } \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt = \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt - \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt$$

$$= g(x) - [\ln t]_x^{3x}$$

$$= g(x) - (\ln 3x - \ln x)$$

$$= g(x) - \ln \frac{3x}{x}$$

$$= g(x) - \ln 3$$

$$\text{Donc } (\forall x > 0) ; g(x) - \ln 3 = \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt \quad \boxed{2}$$

c) D'après $\boxed{1}$ et $\boxed{2}$ on obtient : $(\forall x > 0) ; -2x \leq g(x) - \ln 3 \leq 0$

On en déduit par encadrement que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \ln 3$