Exercice 1

1) On sait que 31 est premier car il n'est divisible par aucun des nombres premiers dont le carré est inférieur à 31 (càd. 2 ; 3; 5).

De même pour 331 il n'est pas divisible par les nombres premiers (2; 3; 5; 7; 11; 13 et 17); donc a_1 et a_2 sont premiers

2) pour tout $n \in \mathbb{N}$; on a :

$$\begin{aligned} a_n &= \underbrace{33 \dots 31}_{n \text{ fois}} \\ &= 1 + 3 \times 10 + 3 \times 10^2 + \dots + 3 \times 10^n \\ &= 1 + 3 \times 10 (1 + 10^2 + \dots + 10^{n-1}) \\ &= 1 + 3 \times 10 \times \frac{1 - 10^n}{1 - 10} \\ &= 1 + 3 \times \frac{10^{n+1} - 10}{9} \\ &= 1 + \frac{10^{n+1} - 10}{3} \\ &= \frac{3 + 10^{n+1} - 10}{3} \\ &= \frac{10^{n+1} - 7}{3} \end{aligned}$$

Donc : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; \boxed{3a_n + 7 = 10^{n+1}}$.

Remarque : On peut aussi faire une démonstration par récurrence

3) soit $k \in \mathbb{N}$;

On a 31 est premier positif et 31 ne divise pas 10 ; donc $31 \wedge 10 = 1$.

D'après le théorème de Fermat : $10^{31-1} \equiv 1[31]$, soit $10^{30} \equiv 1[31]$

Donc $10^{30k} \equiv 1[31]$, par suite $10^{30k+2} \equiv 10^2[31]$ **(1)**

Or $10^2 \equiv 7[31]$ **(2)**

De **(1)** et **(2)** on déduit que : $(\forall k \in \mathbb{N}) ; \boxed{10^{30k+2} \equiv 7[31]}$

4) On a $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; 3a_n + 7 = 10^{n+1}$

Donc pour tout $k \in \mathbb{N}$; on a $30k+1 \in \mathbb{N}^*$, par suite : $3a_{30k+1} + 7 = 10^{30k+1+1}$

et on a : $10^{30k+2} \equiv 7[31]$, donc : $3a_{30k+1} + 7 \equiv 7[31]$

par suite : $(\forall k \in \mathbb{N}) ; \boxed{3a_{30k+1} \equiv 0[31]}$.

5) Supposons que $n \equiv 1[30]$

Montrons que l'équation : (E): $a_n x + 31y = 1$ n'admet pas de solutions dans $\mathbb{Z}^2$

Supposons que l'équation (E) admet une solution $(x_0; y_0)$ dans $\mathbb{Z}^2$.

On a $n \equiv 1[30]$, alors $n = 1 + 30k$ où $k \in \mathbb{N}$

Or, d'après la question (4+++), on a $3a_{30k+1} \equiv 0[31]$, alors 31 divise $3a_{30k+1}$

Et comme 31 et 3 sont deux nombres premiers distincts, alors $31 \wedge 3 = 1$

Et d'après le théorème de Gauss 31 divise a_{30k+1}

Alors 31 divise $a_{30k+1}x_0 + 31y_0$.

Or $(x_0; y_0)$ est solution de (E), alors $a_{30k+1}x_0 + 31y_0 = 1$.

Donc : 31 divise 1, ce qui est absurde.

Conclusion

(E) n'admet pas de solution.

Exercice 2 :

- $(\mathbb{C}; +; \times)$ est un corps commutatif

- $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \times)$ est un anneau unitaire de zéro $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Pour tout $(a; b) \in \mathbb{R}^2$, on pose : $M(a; b) = \begin{pmatrix} a & a-b \\ b & a+b \end{pmatrix}$ et soit $E = \{M(a; b) / (a; b) \in \mathbb{R}^2\}$

1- Montrons que E est un sous-groupe de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +)$.

On a : $\blacktriangleright E \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $E \neq \emptyset$ (car $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = M(0; 0) \in E$)

$\blacktriangleright$ Soient $M(a; b) \in E$ et $M(a'; b')$ deux éléments de (E) :

$$\begin{aligned} M(a; b) - M(a'; b') &= \begin{pmatrix} a & a-b \\ b & a+b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a' & a'-b' \\ b' & a'+b' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a-a' & (a-a')-(b-b') \\ b-b' & (a-a')+(b-b') \end{pmatrix} \\ &= M(a-a'; b-b') \end{aligned}$$

Donc $M(a; b) - M(a'; b') \in E$

Conclusion.

$(E; +)$ est un sous-groupe de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +)$.

2- Soit $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

On a : $J^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Or $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin E$, car si $a=1$ et $b=0$ alors $a-b=1 \neq 2$

Donc $(\exists J \in E) / J \times J \notin E$; par suite E n'est pas stable dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); \times)$.

3- la loi * définie par :

Pour tout A ; B dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$; $A * B = A \times N \times B$; avec $N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Et $\varphi : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$
 $a+ib \mapsto M(a; b)$ où $(a; b) \in \mathbb{R}^2$

a) Soit $z = a+ib$ et $\bar{z} = a-ib$ dans $\mathbb{C}^*$

$$\begin{aligned}
\text{On a : } \varphi(z) * \varphi(z') &= \varphi(a+ib) * \varphi(a'+ib') \\
&= M(a;b) * M(a';b') \\
&= \begin{pmatrix} a & a-b \\ b & a+b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a' & a'-b' \\ b' & a'+b' \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a & -a+a-b \\ b & -b+a+b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a' & a'-b' \\ b' & a'+b' \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a' & a'-b' \\ b' & a'+b' \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} aa' - bb' & a(a'-b') - b(a'+b') \\ ba' + ab' & b(a'-b') + a(a'+b') \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} aa' - bb' & (aa' - bb') - (ab' + a'b) \\ ab' + a'b & (aa' - bb') + (ab' + a'b) \end{pmatrix} \\
&= M(aa' - bb'; ab' + a'b)
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\varphi(z \times z') &= \varphi((a+ib) \times (a'+ib')) \\
&= \varphi((aa' - bb') + i(ab' + a'b)) \\
&= M(aa' - bb'; ab' + a'b)
\end{aligned}$$

D'où : $(\forall ((a;b); (a';b')) \in (\mathbb{R}^2 - \{(0;0)\})^2)$

$$\varphi(z) * \varphi(z') = \varphi(z \times z')$$

Conclusion : φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*; \times)$ vers $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); *)$.

b) On a : $\varphi(\mathbb{C}^*) = \{\varphi(z) / z \in \mathbb{C}^*\}$, donc :

$$\begin{aligned}
\varphi(\mathbb{C}^*) &= \{M(a,b) / (a,b) \in \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}\} \\
&= \{M(a,b) / M(a,b) \neq M(0,0)\} \\
&= E - \{O\}
\end{aligned}$$

Alors : $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$

c) On sait que $(\mathbb{C}; +; \times)$ est un corps commutatif

On a φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*; \times)$ vers $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); *)$ et $(\mathbb{C}^*; \times)$ est un groupe commutatif.

Alors $(\varphi(\mathbb{C}^*); *)$ est un groupe commutatif .

Et comme $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$; alors $(E^*; *)$ est un groupe commutatif.

4) Soient A ; B et C dans E; on a :

$$\begin{aligned}
A * (B + C) &= A \times N \times (B + C) \\
&= A \times (N \times B + N \times C) \quad (\text{car } \times \text{ est distributive par rapport à } + \text{ dans } \mathcal{M}_2(\mathbb{R})) \\
&= A \times N \times B + A \times N \times C \\
&= A * B + A * C
\end{aligned}$$

5) D'après ce qui précède , on a :

• $(E; +)$ est un groupe commutatif d'élément neutre O .

- $(E^*, *)$ est un groupe commutatif
 - $A * (B + C) = (A * B) + (A * C)$, et $*$ est commutative dans E , alors $(B + C) * A = (B * A) + (C * A)$
- Donc la loi ' $*$ ' est distributive par rapport à la loi '+' dans E .
On en déduit que $(E; +; *)$ est un corps commutatif.

Exercice 3

1) Soit $\theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] - \left\{\frac{\pi}{4}\right\}$ et l'équation dans $\mathbb{C}$, (E): $z^2 - \sqrt{2}e^{i\theta}z + e^{2i\theta} = 0$

$$\begin{aligned} \text{a) } \Delta &= (-\sqrt{2}e^{i\theta})^2 - 4e^{2i\theta} \\ &= 2e^{2i\theta} - 4e^{2i\theta} \\ &= -2e^{2i\theta} \\ &= (\sqrt{2}ie^{i\theta})^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) On a : } \bullet) z_1 &= \frac{\sqrt{2}e^{i\theta} + \sqrt{2}ie^{i\theta}}{2} \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)e^{i\theta} \\ &= e^{i\frac{\pi}{4}}e^{i\theta} \\ &= e^{i\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)} = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet) z_2 &= \frac{\sqrt{2}e^{i\theta} - \sqrt{2}ie^{i\theta}}{2} \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)e^{i\theta} \\ &= e^{-i\frac{\pi}{4}}e^{i\theta} \\ &= e^{i\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)} = \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

Donc : $\boxed{z_1 = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)}$ et $\boxed{z_2 = \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)}$

2) $I(1)$; $J(-1)$; $T_1\left(e^{i\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)}\right)$; $T_2\left(e^{i\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)}\right)$ et $A(\sqrt{2}e^{i\theta})$

a) Calculons $\frac{z_{T_1} - z_{T_2}}{z_A - z_O}$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \frac{z_{T_1} - z_{T_2}}{z_A - z_O} &= \frac{e^{i\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)} - e^{i\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)}}{\sqrt{2}e^{i\theta}} \\ &= \frac{\left(e^{i\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)} - e^{i\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)}\right)e^{-i\theta}}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sqrt{2} \left(e^{i\frac{\pi}{4}} - e^{-i\frac{\pi}{4}} \right)}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{2} \times 2i \sin \frac{\pi}{4}}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{2} \times 2i \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = i
 \end{aligned}$$

Donc : $\frac{z_{T_1} - z_{T_2}}{z_A - z_O} = i$

D'où : $\arg \left(\frac{z_{T_1} - z_{T_2}}{z_A - z_O} \right) \equiv \left(\frac{\pi}{2} [2\pi] \right)$ alors $\left(\overline{OA}; \overline{T_2T_1} \right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$

Par suite les droites $\overline{OA}$ et $\overline{T_2T_1}$ sont perpendiculaires.

b) K milieu de $\overline{T_2T_1}$ donc l'affixe de K est :

$$\begin{aligned}
 \frac{z_{T_1} + z_{T_2}}{2} &= \frac{e^{i\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)} + e^{i\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)}}{2} \\
 &= \frac{\left(e^{i\frac{\pi}{4}} + e^{-i\frac{\pi}{4}} \right) e^{i\theta}}{2} \\
 &= \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) e^{i\theta} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\theta}
 \end{aligned}$$

Donc : $z_K = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\theta}$

Alors : $\frac{z_K - z_O}{z_A - z_O} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\theta}}{\sqrt{2} e^{i\theta}} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$

Donc les points K ; O et A sont alignés.

c) On a K est le milieu du segment $\overline{T_2T_1}$.

La droite (OA) passe par K et perpendiculaire à $\overline{T_2T_1}$ (d'après 2- a et 2-b)

Alors la droite (OA) est la médiatrice du segment $\overline{T_2T_1}$.

3. $r = R \left(T_1; \frac{\pi}{2} \right)$

a) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation r ; alors : $(z' - z_{T_1}) = (z - z_{T_1}) e^{i\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow z' = iz + z_{T_1} - z_{T_1} e^{i\frac{\pi}{2}}$

$$\Leftrightarrow z' = iz + z_{T_1} (1 - i)$$

$$\Leftrightarrow z' = iz + e^{i\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)} \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

$$\Leftrightarrow z' = iz + \sqrt{2} e^{i\theta}$$

Donc l'expression complexe de la rotation r est :

$$M'(z') = r(M(z)) \Leftrightarrow z' = iz + \sqrt{2}e^{i\theta}$$

$$b) B(b) = r(I) \Leftrightarrow b = i \times 1 + \sqrt{2}e^{i\theta}$$

$$\Leftrightarrow b = i + \sqrt{2}e^{i\theta}$$

D'où, l'affixe de B est : $b = i + \sqrt{2}e^{i\theta}$

$$c) \text{ Calculons } \frac{z_B - z_A}{z_I - z_J}$$

$$\blacktriangleright \frac{z_B - z_A}{z_I - z_J} = \frac{i + \sqrt{2}e^{i\theta} - \sqrt{2}e^{i\theta}}{1 - (-1)} = \frac{1}{2}i$$

$$\text{Donc : } \arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_I - z_J}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\text{D'où : } (\overline{IJ}; \overline{AB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

Par suite les droites (AB) et (IJ) sont perpendiculaires.

4) Soit $t_{-\vec{v}}$ translation du vecteur $(-\vec{v})$ et $\vec{v}(i)$

$$\text{On a : } C = t_{-\vec{v}}(A) \Leftrightarrow z_C = z_A - i$$

$$\Leftrightarrow z_C = \sqrt{2}e^{i\theta} - i.$$

Donc l'affixe du point C image du point A par la translation $t_{-\vec{v}}$ est : $z_C = \sqrt{2}e^{i\theta} - i$

5) L'affixe du milieu du segment $[BC]$ est :

$$\blacktriangleright \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{i + \sqrt{2}e^{i\theta} + \sqrt{2}e^{i\theta} - i}{2}$$
$$= \sqrt{2}e^{i\theta}$$

Donc A est le milieu du segment $[BC]$.

Exercice 4

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x \ln x}{1+x^2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. a) les fonctions $x \mapsto -x$; $x \mapsto \ln x$ et $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ sont continues sur

Donc la fonction f est continue sur $]0; +\infty[$ comme produits de de fonctions continues sur $]0; +\infty[$.

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x \ln x}{1+x^2} = 0$$

(Car $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$)

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$; d'où f est continue à droite en 0 .

Par suite f est continue sur $]0; +\infty[$.

b) le signe de $f(x)$ est celui de $(-\ln x)$ sur $]0; +\infty[$.

Donc : $\blacktriangleright f(x) \leq 0$ sur $[1; +\infty[$

$\blacktriangleright f(x) \geq 0$ sur $]0;1]$

$$\begin{aligned} 2- a) \text{ Soit } (x \in \mathbb{R}_+^*), \text{ on a : } f\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{-\frac{1}{x} \ln\left(\frac{1}{x}\right)}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{x} \ln x}{1 + \frac{1}{x^2}} \\ &= \frac{x \ln x}{x^2 + 1} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$$

b) les fonctions $x \mapsto x \ln x$ et $x \mapsto 1 + x^2$ sont dérivables sur $]0; +\infty[$ et $1 + x^2 \neq 0$ sur $]0; +\infty[$ donc la fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas sur $]0; +\infty[$.

c) On a f est continue sur $[0;1]$ et dérivable sur $]0;1[$ et $f(1) = f(0) = 0$ donc d'après le théorème de Rolle : $\boxed{(\exists \alpha \in]0;1[) : f'(\alpha) = 0}$

$$d) \text{ On a : } (\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$$

$$\text{Donc : } \left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right)' = (-f(x))' \text{ d'où } -\frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right) = -f'(x)$$

$$\text{Alors } \frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right) = f'(x)$$

$$\text{Comme } (\alpha \in \mathbb{R}_+^*) ; \text{ alors : } \frac{1}{\alpha^2} f'\left(\frac{1}{\alpha}\right) = f'(\alpha) .$$

$$\text{Or } f'(\alpha) = 0 ; \text{ donc : } \boxed{f'\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0}$$

II- $(\forall x \in [0; +\infty[) ; F(x) = \int_0^x f(t) dt .$

1-a) Soit $t \in [1; +\infty[$

$$\bullet \text{ On a : } \frac{t^2}{1+t^2} - 1 = -\frac{1}{1+t^2} \text{ et } \frac{1}{1+t^2} > 0$$

$$\text{Donc : } \frac{t^2}{1+t^2} \leq 1$$

$$\bullet \text{ On a : } \frac{1}{2} - \frac{t^2}{1+t^2} = \frac{1-t^2}{2(1+t^2)} \text{ et } 1-t^2 \leq 0 \text{ (car } t \in [1; +\infty[) ; \text{ donc : } \frac{1}{2} \leq \frac{t^2}{1+t^2}$$

$$\text{D'où : } (\forall t \in [1; +\infty[) ; \boxed{\frac{1}{2} \leq \frac{t^2}{1+t^2} \leq 1}$$

b) Soit $x \in [1; +\infty[$.D'après ce qui précède ; on a :

$$; \frac{1}{2} \leq \frac{t^2}{1+t^2} \leq 1 \text{ et } \ln t \geq 0$$

$$\text{Donc : } \frac{1}{2} \frac{\ln t}{t} \leq \frac{t \ln t}{1+t^2} \leq \frac{\ln t}{t}.$$

$$\text{Alors : } -\frac{\ln t}{t} \leq f(t) \leq -\frac{1}{2} \frac{\ln t}{t}$$

Et comme $1 \leq x$ et les fonctions $t \mapsto \frac{\ln t}{t}$; $t \mapsto f(t)$ et $t \mapsto -\frac{1}{2} \frac{\ln t}{t}$ sont continues sur $[1, x]$

$$\text{Alors } -\int_1^x \frac{\ln t}{t} dt \leq \int_1^x f(t) dt \leq -\frac{1}{2} \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt$$

$$\text{Donc } \int_0^1 f(t) dt - \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt \leq \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt \leq \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2} \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt$$

$$\text{D'où } F(1) - \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt \leq \int_0^x f(t) dt \leq F(1) - \frac{1}{2} \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt$$

$$F(1) - \left[\frac{1}{2} (\ln t)^2 \right]_1^x \leq F(x) \leq F(1) - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} (\ln t)^2 \right]_1^x$$

Par suite

$$F(1) - \frac{1}{2} (\ln x)^2 \leq F(x) \leq F(1) - \frac{1}{4} (\ln x)^2$$

$$\text{Alors : } (\forall x \in [1; +\infty[); \boxed{F(1) - \frac{1}{2} (\ln x)^2 \leq F(x) \leq F(1) - \frac{1}{4} (\ln x)^2}$$

c) ► On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(1) - \frac{1}{4} (\ln x)^2 = -\infty$ et $F(x) \leq F(1) - \frac{1}{4} (\ln x)^2$ pour tout $x \in [1; +\infty[$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\infty$$

► On a pour tout $x \in [1; +\infty[$: $F(1) - \frac{1}{2} (\ln x)^2 \leq F(x) \leq F(1) - \frac{1}{4} (\ln x)^2$

$$\text{Donc } \frac{F(1)}{x} - \frac{1}{2} \frac{(\ln x)^2}{x} \leq \frac{F(x)}{x} \leq \frac{F(1)}{x} - \frac{1}{4} \frac{(\ln x)^2}{x}$$

$$\text{De plus : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(1)}{x} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} \right)^2 \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(t^2)}{t} \right)^2 \quad (t = \sqrt{x}) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} 4 \left(\frac{\ln t}{t} \right)^2 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(1)}{x} - \frac{1}{2} \frac{(\ln x)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(1)}{x} - \frac{1}{4} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$$

$$\text{Par Suite : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0$$

Interprétation géométrique

La courbe de F admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$.

2. a) On a f est continue sur $[0; +\infty[$ et $0 \in [0; +\infty[$ donc F est dérivable sur $[0; +\infty[$.

Et on a : $(\forall x \in [0; +\infty[) ; F'(x) = f(x)$.

Par suite : $(\forall x \in [0; +\infty[) ; F'(x) = \frac{-x \ln x}{1+x^2}$

b) D'après la question I-1-a) on a : $\blacktriangleright f(x) \geq 0$ sur $]0; 1]$ et $f(x) \leq 0$ sur $[1; +\infty[$

D'où le tableau de variation de F .

x	0	1	$+\infty$
$F'(x)$		+	-
$F(x)$	0	$F(1)$	$-\infty$

III- 1- a) Soit $t \in]0; +\infty[$

On considère la fonction φ définie par : $\varphi(t) = e \times t \ln t + 1$

On a : $\varphi'(t) = e \times \ln t + e$
 $= e \times (\ln t + 1)$

Donc : $\blacktriangleright \varphi'(t) \leq 0$ pour $t \in]0; \frac{1}{e}]$

$\blacktriangleright \varphi'(t) \geq 0$ pour $t \in [\frac{1}{e}; +\infty[$

d'où le tableau de variation de φ .

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$\varphi'(x)$		-	+
$\varphi(x)$	1	0	$+\infty$

Donc 0 est une valeur minimale pour φ sur $]0;+\infty[$; d'où :

$$(\forall t \in]0;+\infty[) ; \varphi(t) \geq 0.$$

Par suite : $(\forall t \in]0;+\infty[) ; -t \ln t \leq \frac{1}{e}$

b) D'après la question précédente on a pour tout :

$$-t \ln t \leq \frac{1}{e} \quad (1) \quad \text{et on a : } \frac{1}{1+t^2} > 0 \quad (2)$$

De (1) et (2) on déduit que : $(\forall t \in]0;+\infty[) ; \frac{-t \ln t}{1+t^2} \leq \frac{1}{e} \frac{1}{1+t^2}$

Et comme $\frac{1}{1+t^2} \leq 1$, alors : $(\forall t \in]0;+\infty[) ; f(t) \leq \frac{1}{e}$.

c) Soit $x \in]0;+\infty[$, et soit $0 \leq t \leq x$

On a : $f(t) \leq \frac{1}{e}$ (d'après la question précédente)

Et on a f est continue sur $[0;x]$, alors :

$$\int_0^x f(t) dt \leq \int_0^x \frac{1}{e} dt \quad \text{d'où } \int_0^x f(t) dt \leq \frac{x}{e} < x$$

Alors : $(\forall x \in]0;+\infty[) : \boxed{F(x) < x}$

2- $(u_n) : \begin{cases} u_0 \in]0;1[\\ u_{n+1} = F(u_n) \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

Montrons par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n \in]0;1[$

a) **pour $n=0$**

On a $u_0 \in]0;1[$

Soit $n \in \mathbb{N}$

Supposons que $u_n \in]0;1[$ et montrons que $u_{n+1} \in]0;1[$

On a d'après ce qui précède que F est strictement croissante sur $]0;1[$

Alors $F(0) < F(u_n) < F(1)$

Et comme $F(0)=0$ et $F(1) < 1$ (d'après III-1-c)

Alors $u_{n+1} \in]0;1[$.

Conclusion :

$$(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n \in]0;1[$$

b) D'après la question III-1. c) On a :

$$(\forall x \in]0;+\infty[) ; F(x) < x$$

Et comme $u_n \in]0;1[$; alors $F(u_n) \leq u_n$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} \leq u_n$

Par suite (u_n) est strictement décroissantes et comme elle est minorée par 0 alors elle est convergente.

c) On a : •) f est continue sur $[0;1]$ et $F([0;1]) = [F(0), F(1)] \subset [0;1]$

-) $u_0 \in [0;1]$
-) $u_{n+1} = F(u_n)$
-) (u_n) est convergente

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ est la solution de l'équation $F(x) = x$, dans $[0;1]$

Or d'après ce qui précède on a : $(\forall x \in]0;+\infty[) : F(x) < x$

Et comme $F(0) = 0$, alors 0 est la seule solution de l'équation $F(x) = x$

Donc : $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0}$.

Exercice 5 :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$

1) Les fonctions $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ et $x \mapsto e^{-\frac{1}{x}}$ sont continues sur $]0;+\infty[$, alors g est continue sur $]0;+\infty[$

(comme produit de deux fonctions continues sur $]0;+\infty[$)

D'autre part, on a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} t^2 e^t \quad (t = \frac{-1}{x}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = g(0)$, par suite g est continue à droite en 0.

Ainsi, g est continue sur $[0, +\infty[$

2) $(\forall x \in [0;+\infty[) : L(x) = \int_x^1 g(t) dt = -\int_1^x g(t) dt$

a) On a g est continue sur $[0, +\infty[$ et $1 \in [0, +\infty[$, donc L est dérivable sur $[0, +\infty[$
Par suite, L est continue sur $[0, +\infty[$.

b) Pour tout $x \in]0;+\infty[$, on a :

$$L(x) = \int_x^1 g(t) dt = \left[e^{-\frac{1}{t}} \right]_x^1 = e^{-1} - e^{-\frac{1}{x}}$$

c) On a : $(\forall x \in]0;+\infty[) \quad L(x) = e^{-1} - e^{-\frac{1}{x}}$, alors :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} L(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-1} - e^{-\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} e^{-1} - e^t \quad (t = \frac{-1}{x}) \\ &= e^{-1} \end{aligned}$$

Et comme L est continue sur $[0, +\infty[$, alors L est continue à droite en 0.

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} L(x) = L(0)$, par suite $L(0) = e^{-1}$

$$3) (\forall n \in \mathbb{N}^*) : s_n = \frac{1}{n} \sum_{p=0}^{n-1} g\left(\frac{p}{n}\right)$$

On g est continue sur $[0, +\infty[$, donc g est continue sur $[0, 1]$

Alors $(s_n)_{n \geq 1}$ est convergente, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \int_0^1 g(t) dt = L(0)$

Et comme $L(0) = e^{-1}$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = e^{-1}$