<p>المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة</p>	<p>Année scolaire : 2023/24</p>
<p>Durée : 4 heures Coefficient : 9</p>	<h2>Simili de mathématiques</h2>	<p>Niveau : 2^e Année du Baccalauréat filière : Sciences mathématiques</p>

Instructions générales

- * L'utilisation de la calculatrice n'est pas autorisée.
- * Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient
- * L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter
- * Écrire **lisiblement** et vérifier que le sujet est complet : il comporte 4 pages numérotées de 1 à 4, celle-ci comprise.

Composantes de l'épreuve

L'épreuve est composée de trois exercices est un problème indépendants entre eux et répartis suivants les domaines :

Exercice 1	Les nombres complexes	3.75 points
Exercice 2	L'arithmétique	3.25 points
Exercice 3	Les structures algébriques	3 points
Problème	Analyse : Étude de fonctions- Les suites- Calcul intégral	10 points

$\ln$: désigne le logarithme népérien et e la base du logarithme népérien.

	<p>Exercice1 (3.75 points)</p> <p>Soit m un nombre complexe. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation :</p> $(E) \quad z^3 + (2 - i)z^2 + (m^2 + 1 - 2i)z - i(m^2 + 1) = 0$ <p>Le plan complexe est muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.</p> <p>0.25pts I)1- a) Vérifier que $z_0 = i$ est solution de l'équation (E).</p> <p>0.5pts b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E).</p> <p>0.5pts 2- Déterminer l'ensemble des points $M(m)$ pour que au moins deux solutions de l'équation (E) aient même module.</p> <p>0.5pts 3- On pose : $z_1 = -1 + im$; $z_2 = -1 - im$ et on suppose $m = e^{i\theta}$ avec $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ Ecrire z_1 et z_2 sous forme trigonométrique.</p> <p>0.5pts II) On considère les points M_1; M_2 et M d'affixe respectivement z_1; z_2 et m.</p> <p>0.5pts 1- Déterminer l'ensemble des points $M(m)$ pour que M_1; M_2 et M soient alignés.</p> <p>2- On suppose $m\bar{m} + \operatorname{Re}(m) \neq 0$.</p> <p>Soit $\mathcal{R}$ l'application qui transforme $N(z)$ au point $N'(z')$ telle que : $z' = -1 + iz$.</p> <p>0.5pts a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une rotation dont on précisera son centre Ω et une mesure de son angle.</p> <p>0.5pts b) Montrer que $\frac{z_2 - m}{z_2 - z_1}$ est imaginaire pur $\iff m\bar{m} - \operatorname{Im}(m) = 0$</p> <p>0.5pts c) En déduire l'ensemble des points $M(m)$ tel que M_2; M_1; M et Ω est cocyclique.</p>
	<p>Exercice2 (3.25 points)</p> <p>1- On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation : $(E) : 23x - 48y = 1$</p> <p>0.25pts a) Montrer que l'équation (E) admet au moins une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$</p> <p>0.5pts b) Déterminer une solution particulière de (E) en utilisant l'algorithme d'Euclide.</p> <p>0.25pts c) Montrer que l'ensemble solution de (E) est $S = \{(-25 + 48k; -12 + 23k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$</p> <p>2- On considère dans $\mathbb{N}$ le système $(S) : \begin{cases} n \equiv 8[23] \\ n \equiv 9[48] \end{cases}$</p> <p>0.75pts Montrer que : $n \equiv 537 [1104] \iff n$ solution du système (S) (On remarque que $(1104 = 48 \times 23)$)</p> <p>3- Soit a et b deux nombres entiers naturels.</p> <p>0.25pts a) Vérifier que : $(23)^2 \equiv 1 [48]$</p> <p>0.5pts b) Montrer que : $(a^{23} \equiv b [91] \quad \text{et} \quad a^{48} \equiv 1 [91]) \implies b^{23} \equiv a [91]$</p> <p>0.75pts 4- Déterminer en utilisant le théorème de Fermat le reste de la division de 3^{48} sur 91.</p>

Exercice3 (3 points)

On rappelle que l'ensemble $(M_3(\mathbb{R}); +; \times)$ est un anneau unitaire.

$$\text{On considère l'ensemble } G = \left\{ M_\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

0.5pts 1- Montrer que G est une partie stable par rapport à la multiplication des matrices dans l'ensemble $M_3(\mathbb{R})$.

0.5pts 2- On considère l'ensemble : $\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$

Montrer que $(\mathcal{U}; \times)$ est un sous groupe de $(\mathbb{C}^*; \times)$

3- On considère l'application Φ définie de $\mathcal{U}$ vers G par $\Phi(e^{i\theta}) = M_\theta$

0.5pts a) Montrer que Φ est un isomorphisme de $(\mathcal{U}; \times)$ vers $(G; \times)$

0.5pts b) En déduire que $(G; \times)$ est un groupe commutatif.

1pts 4- Calculer $(M_\theta)^{-1}$ puis $(M_\theta)^n$ tel que n un nombre entier relatif non nul .

Problème (10 points)**Partie I** (6.75 points)

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{x - \ln x} & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

(C_f) la courbe représentative de f dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

0.5pts 1- a) Montrer que : $(\forall x \in]0; +\infty[) : x - \ln x > 0$

0.25pts b) Montrer que f est continue à droite en 0

0.5pts c) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0

0.5pts 2- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et donner une interprétation graphique du résultat.

0.5pts 3- a) Montrer que : $(\forall x \in]0; +\infty[) : f'(x) = \left(\frac{1-x}{x}\right) (f(x))^2$

0.5pts b) Dresser le tableau de variations de f .

4- Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

0.5pts a) Montrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{n}$ admet dans $]0; +\infty[$ exactement deux solutions distinctes α_n et β_n tel que $0 < \alpha_n \leq 1 < \beta_n$

0.5pts b) Montrer que $(\forall n \geq 2)$ on a $\beta_n > n$ puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n$

0.5pts c) Montrer que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est décroissante puis en déduire qu'elle est convergente.

0.5pts d) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$ et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln \alpha_n}{n}$

5- Soit g la restriction de f sur l'intervalle $]1; +\infty[$ et (C_g) sa courbe représentative dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

0.25pts a) Montrer que la fonction g admet une réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on précisera.

0.25pts	b) Montrer que : $(g^{-1})'(\frac{1}{n}) = \frac{n^2 \beta_n}{1 - \beta_n}$
	6- On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = \frac{e^x}{1 + xe^x}$ et (C_h) sa courbe représentative dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
0.25pts	a) Montrer que la fonction h est le composée de la fonction f et la fonction $x \rightarrow e^{-x}$
0.5pts	b) En déduire le tableau de variations de h en utilisant les propriétés du composée de deux fonctions
0.75pts	7- Tracer les courbes (C_f) ; (C_g) et (C_h) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
	Partie II (3.25 points)
	On considère la fonction F définie sur $[0; +\infty[$ par : $\begin{cases} F(x) = \int_x^{2x} f(t) dt & x > 0 \\ F(0) = 0 \end{cases}$
0.5pts	1- a) Montrer que : $(\forall x \in]0; \frac{1}{2}[); (\exists c \in]x; 2x[)$ tel que $F(x) = \frac{x}{c - \ln c}$
0.25pts	b) Montrer que F est dérivable à droite en 0 (Remarquer que f est croissante sur $[0; 1]$)
0.25pts	2- a) Montrer que $\forall x \geq 1$; $F(x) = \int_x^{2x} \left(1 - \frac{1}{t}\right) f(t) dt + \int_x^{2x} \frac{1}{t} f(t) dt$
0.25pts	b) Montrer que $\forall x \geq 1$ on a : $\frac{\ln 2}{2x - \ln 2x} \leq \int_x^{2x} \frac{1}{t} f(t) dt \leq \frac{\ln 2}{x - \ln x}$
0.25pts	c) Montrer que $\forall x \geq 1$ on a : $\int_x^{2x} \left(1 - \frac{1}{t}\right) f(t) dt = \ln \left(1 + \frac{x - \ln 2}{x - \ln x}\right)$
0.25pts	d) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$
0.75pts	3- Montrer que F est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que $\forall x \in]0; +\infty[$ on a :
	$F'(x) = \frac{\ln(2) - \ln(x)}{(2x - \ln(2x))(x - \ln(x))}$
0.75pts	4- Soit $k \in]0; +\infty[$ on désigne par $\mathcal{A}(k)$ l'aire du domaine du plan délimité par la courbe (C_f) l'axe des abscisses et les droites d'équations : $x = k$ et $x = 2k$ Pour quelle valeur de k la valeur de l'aire $\mathcal{A}(k)$ est maximale ?

Fin de l'épreuve